

## ¿Qué es ABACAVIR/LAMIVUDINA?

Es un antivírico que contiene **abacavir**, y **lamivudina** que impide la replicación viral, y se utiliza en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar ABACAVIR/LAMIVUDINA?

Debe tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día** (a la misma hora). No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a abacavir, lamivudina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o cardiovascular.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, cansancio, insomnio y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Trastorno del sueño, dolor abdominal, y reacciones alérgicas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Pancreatitis y reacciones dérmicas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿ABACAVIR/LAMIVUDINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con abacavir y lamivudina son:


## ¿Cómo debo conservar ABACAVIR/LAMIVUDINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Observaciones:

Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es ATAZANAVIR/COBICISTAT?

Es un antivirico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar ATAZANAVIR /COBICISTAT?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.  
No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a atazanavir, cobicistat o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o hemofilia.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Ictericia y nauseas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Dolor de cabeza, insomnio, alteraciones del sueño, vómitos, diarrea, reacciones cutáneas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatoesplenomegália y síndrome Stevens-Johnson.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿ATAZANAVIR/COBICISTAT puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con atazanavir y cobicistat son:

Astemizol, Terfenadina, Ergotamina, Quetiapina
Ombitasvir/Paritaprevir, Dasabuvir, Simeprevir
Amiodarona, Flecainida, Propafenona, Quinidina,
Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, Rifampicina, Midazolam, Triazolam, , Cisaprida, Domperidona, Alfluzosina
Apixaban, Ribaroxavan, Ticagrelor, Ivabradina, Ranolazina, Sildenafil, Nimodipino, Silodosina, Tamsulosina, Simvastatina, Lovastatina, Budesonida, Fluticasona, Mometasona
Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar ATAZANAVIR/COBICISTAT?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de tu Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

## ¿Qué es EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR?

Es un antivírico que contiene **tenofovir, emtricitabina y efavirenz** impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: sodio

Horario																																	
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24															

## ¿Cómo debería tomarlo?

Deberá tomar la dosis indicada **sin alimentos (una hora antes dos horas después de las comidas) una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito,** tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Tenofovir, Emtricitabina, Efavirenz o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o psiquiátrica.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, reacciones cutáneas, mareo y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Ansiedad, depresión, sueños anormales.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Trastornos psiquiátricos, delirios y reacciones alérgicas (reacciones cutáneas graves) y acidosis láctica

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿Puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones son:

Astemizol, Terfenadina, Ergotamina, Midazolam, Triazolam, carbamazepina

Simeprevir, Obitasvir/paritaprevir, Dasabuvir

Cisaprida, Itraconazol, Posaconazol, Ibavradina Hierba de San Juan,

## ¿Cómo debo conservar el medicamento?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Tomar Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir® al acostarse puede disminuir algunos efectos adversos como los mareos, la somnolencia, etc...).

## ¿Qué es DARUNAVIR?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable



Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar DARUNAVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si toma darunavir una vez al día: **Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**

Si toma darunavir dos veces al día: **Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 1 hora desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a darunavir o alguno de sus excipientes-
- Historial de enfermedad renal, hepática o hemofilia.
- Embarazo y lactancia-

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Insomnio, dolor de cabeza, reacciones dérmicas, vómitos y náuseas
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Trastornos cardíacos y reacciones dérmicas graves.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿DARUNAVIR puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con darunavir son:

Astemizol, Cisaprida, Domperidona, fármacos para el cáncer

Conivaptan, Dapoxetina, Midazolam, Alprazolam, Oxidona

Ivabradina, Eplerenona, Lercanidipino, Nimodipino, Ranolazina,  
Estatinas, Ticagrelor, Tamsulosina,

## ¿Cómo debo conservar DARUNAVIR?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Observaciones:

Darunavir debe ir siempre acompañado en cada dosis con Ritonavir o cobicistat

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento



Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es DARUNAVIR/COBICISTAT?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar DARUNAVIR/COBICISTAT?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.  
No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a darunavir, cobicistat o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal, hepática o hemofilia.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, dolor de cabeza y reacciones dérmicas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Alteraciones del sueño, vómitos, dolor óseo/muscular y reacción alérgica
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Pancreatitis, hepatitis y reacciones dérmicas graves.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿DARUNAVIR/COBICISTAT puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Darunavir y Cobicistat son:

Astemizol, Terfenadina, Ergotamina, Quetiapina
Ombitasvir/Paritaprevir, Dasabuvir, Simeprevir
Amiodarona, Flecaínida, Propafenona, Quinidina,
Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoína, Rifampicina, Midazolam, Triazolam, , Cisaprida, Domperidona
Apixaban, Ribaroxavan, Ticagrelor, Ivabradina, Ranolazina, Sildenafil, Simvastatina, Budesonida, Fluticasona, Mometasona

## ¿Cómo debo conservar DARUNAVIR/COBICISTAT?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es DOLUTEGRAVIR?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable



Excipientes: manitol

Horario																							
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24					

## ¿Cómo debería tomar DOLUTEGRAVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de cuatro horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a dolutegravir o a alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal, hepática o cardiovascular.
- Embarazo o lactancia

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Trastorno del sueño, depresión, dolor abdominal y cansancio
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis e ideas suicidas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿DOLUTEGRAVIR puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con dolutegravir son:

Fenitoina, Fenobarbital, Oxcarbacepina
Rifampicina
Hierro, calcio, antiácidos con magnesio/aluminio, multivitamínicos, Hierba de San Juan.

## ¿Cómo debo conservar DOLUTEGRAVIR?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Observaciones:

En alguna ocasión (cuando el virus tiene algunas resistencias a medicamentos) puede ser necesario que tome este medicamento preferiblemente con alimentos

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es ETRAVIRINA?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable-



Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar ETRAVIRINA?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos dos veces al día**.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a etravirina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Reacciones dérmicas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio y sudoración nocturna
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Alteraciones cardíacas, pancreatitis y hepatitis.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿ETRAVIRINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con etravirina son:

Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina
Daclatasvir, Dasabuvir, Gazoprevir,
Cilostazol, Citalopram, Clopidogrel, Ranolazina
Fosamprenavir, Rifampicina, Enzalutamida, Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar ETRAVIRINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es EVIPLERA®?

Es un antivírico que contiene **tenofovir, emtricitabina y rilpivirina** que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: lactosa, aluminio amarillo anaranjado S

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar EVIPLERA®?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis,** y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito,** tómela si ha pasado menos de cuatro horas desde que ha tomado el medicamento. Hágalo con alimentos.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a tenofovir, emtricitabina, rilpivirina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, vómitos, reacciones dérmicas, insomnio, mareo y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Depresión, sueños anormales, cansancio y reacciones alérgicas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis, fracaso renal y reacciones alérgicas (reacciones cutáneas graves) y acidosis láctica.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿EVIPLERA® puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Eviplera® son:

Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital, Fenitoina

Dexametasona, Rifampicina, Ledipasvir, Metadona

Antiacidos y protectores de estómago (Ranitidina, Omeprazol, Pantoprazol etc.), Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar EVIPLERA®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:



Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es GENVOYA®?

Es un antivirico que contiene, **emtricitabina, elvitegravir /cobicistat y tenofovir alafenamida** impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar GENVOYA®?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 6 horas para la próxima dosis,** y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito,** tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a emtricitabina, elvitegravir/cobicistat, tenofovir o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Náusea.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Sueños anormales, cefalea, mareo, vómitos, diarrea, cansancio, y reacciones cutáneas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Osteonecrosis

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿GENVOYA® puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Genvoya® son:

Astemizol, Terfenadina, Cisaprida, Aprepitant, Ergotamina, Midazolam, Triazolam, Quetiapina, Anticonceptivos
Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital, Fenitoina
Ledipasvir, Daclatasvir
Amiodarona, Ibavradina, Lercanidipino, Ranolazina, Nimodipino, Simvastatina, Lovastatina, Afluzosina, Rifampicina
Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar GENVOYA®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Observaciones:

Si está tomando un **antiácido** (hidróxido de aluminio/magnesio) o un suplemento multivitamínico, **tómelo al menos 4 horas antes**

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

## ¿Qué es LAMIVUDINA?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** y la **Hepatitis B** para mantener la carga viral suprimida



Horario																																						
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24																				

## ¿Cómo debería tomar LAMIVUDINA?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día**.  
 No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela de nuevo si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia lamivudina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o cardiovascular.
- Embarazo o Lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, cansancio, insomnio y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Dolor óseo/muscular y reacciones cutáneas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Angioedema y rabdomilisis

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿ LAMIVUDINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con lamivudina son:


## ¿Cómo debo conservar LAMIVUDINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es RALTEGRAVIR?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: lactosa.  
Comprimidos masticables:  
fructosa, fenilalanina, sorbitol

Horario																										
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24								

## ¿Cómo debería tomar RALTEGRAVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos dos veces al día**.  
No fraccione ni mastique los comprimidos salvo en el caso los comprimidos masticables. Consulte a su farmacéutico

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a raltegravir o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática, depresión o enfermedad psiquiátrica.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Trastorno del sueño, depresión, mareo, dolor de cabeza, reacciones dérmicas y cansancio
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis e ideas suicidas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿RALTEGRAVIR puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con raltegravir son:

Fosamprenavir
Rifampicina
Hierro, magnesio, calcio, multivitamínicos, Hierba de San Juan.

## ¿Cómo debo conservar RALTEGRAVIR?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

En alguna ocasión (cuando el virus tiene algunas resistencias a medicamentos) puede ser necesario que tome este medicamento preferiblemente con alimentos

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es RILPIVIRINA?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar RILPIVIRINA?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos** (comidas calóricas) **una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de cuatro horas desde que ha tomado el medicamento. Hágalo con alimentos.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a rilpivirina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática, cardíaca.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Náuseas, insomnio, mareo y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Depresión, sueños anormales, vómitos, dolor abdominal, reacciones dérmicas cansancio y sequedad de boca.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿RILPIVIRINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con rilpivirina son:

Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital, Fenitoina

Dexametasona, Rifampicina, Metadona, Ledipasvir/Sofosbuvir y otros tratamientos para hepatitis C

Antiacidos y protectores de estomago (Ranitidina, Omeprazol, Pantoprazol etc..), Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar RILPIVIRINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:



Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es STRIBILD®?

Es un antivírico que contiene, **emtricitabina, elvitegravir/cobicistat y tenofovir** que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: lactosa, aluminio amarillo anaranjado S

Horario														20	22	24		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar STRIBILD®?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.  
No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 6 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a emtricitabina, elvitegravir/cobicistat, tenofovir o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, vómitos, reacciones dérmicas, insomnio, mareo y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Depresión, sueños anormales, cansancio y reacciones alérgicas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis, fracaso renal. Osteoporosis y acidosis láctica

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿STRIBILD® puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Stribild® son:

Astemizol, Terfenadina, Cisaprida, Aprepitant, Ergotamina,  
Midazolam, Triazolam, Quetiapina, Anticonceptivos

Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenobarbital, Fenitoina

Ledipasvir, Daclatasvir, Rifampicina

Amiodarona, Ibavradina, Lercanidipino, Ranolazina, Nimodipino,  
Simvastatina, Lovastatina, Alfluzosina

Hierba de San Juan

## ¿Cómo debo conservar STRIBILD®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Si está tomando un antiácido(hidróxido de aluminio /magnesuio) o un suplemento multivitamínico, tómelo al menos 4 horas antes

Esta hoja NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es TENOFOVIR/EMTRICITABINA?

Es un antivírico que contiene **tenofovir y emtricitabina** que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar TENOFOVIR/EMTRICITABINA?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a tenofovir, emtricitabina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- Embarazo o lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, reacciones cutáneas y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Mareo y dolor abdominal.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis, angioedema, osteoporosis y acidosis láctica

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿TENOFVIR/EMTRICITABINA puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con tenofovir y emtricitabina son:

Diclofenaco y otros antiinflamatorios

## ¿Cómo debo conservar TENOFVIR/EMTRICITABINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Servicio de Farmacia. Tlf: 981 17 64 89

## ¿Qué es TRIUMEQ®?

Es un antivírico que contiene **abacavir, lamivudina y dolutegravir** que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** para mantener la carga viral indetectable.



Excipientes: manitol

Horario																									
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24							

## ¿Cómo debería tomar TRIUMEQ®?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de cuatro horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a abacavir, lamivudina y dolutegravir o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o cardiovascular.
- Embarazo y lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, cansancio, insomnio y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Trastorno del sueño, dolor abdominal, cansancio y reacciones alérgicas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Pancreatitis y reacciones dérmicas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿TRIUMEQ® puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Triumeq® son:

Fenitoina, Fenobarbital, Oxcarbacepina
Rifampicina
Hierro, calcio, antiácidos con magnesio/aluminio, multivitamínicos, Hierba de San Juan.

## ¿Cómo debo conservar TRIUMEQ®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción-cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos